

祝い抜こう港まづり（四月五日・十六日）

園藝文庫

ト、なす、きうり、トマト、南瓜、西瓜等の移植（温床）パーセリ、セリリー、リーキ（西洋葱）、三葉、花椰菜子持甘藍、オクラ、アスパラガス、ちしや、夏大根、五寸人参、ふだん草等の時つけ（露地）▲えんどう、そら豆の病害虫の防除（硫酸鉛加用四斗式ボルドー液の撒布）▲里芋の植

主食配給所の増設



け▲枇杷の摘果、袋掛け
▲柑橘、栗の接木▲柑橘の病害予防(發芽前四斗式ボルドー液撒布)
▲桃、柿の薬剤撒布(石灰硫黃合劑六倍液)
●中旬 里芋、しょうが、蓮根の植つけ▲西瓜、南瓜、甜瓜、越瓜、胡瓜、菜豆、とうがらし、夏かぶ等の蒔つけ(露地)
○早熟蔬菜苗の定植地整地、基肥施用(支柱立)▲馬鈴薯の芽かき(二、三本立)、追肥、土寄せ甘諸育苗床の管理▲ダリヤ、グラデオラスの植つけ▲柑橘、栗の接木

早熟蔬菜(きゅうり・なす・トマト等)の植出し(四月二五日頃適期、晚霜に注意)▲大豆(枝豆)落花生の蒔つけ▲ぶどうの不要芽の摘除▲果樹の病害虫防除(梨、桃)三斗式ボルドー液
等の不要芽の摘除▲果樹の病害虫防除(梨、桃)三斗式ボルドー液撒布)▲綠肥の鋤込
●播種してから一週間内外で發芽するから、発芽後半ヶ月位を経て苗が約二寸位に伸んだら開引を行う。この間引を行つて葉の周縁が上に捲れており、節間が粗くて葉液に子球の芽ぐんでるものを残し、之に反するものは不良苗として除く
●移植は苗が三寸一寸五分位となつた時、畦巾一尺、株間二寸の間隔に植つける。この

巡回映畫について

家庭欄

◎ 食用油の
給御注意

補修布特配

麥の病害は蔓延する！

石灰硫黃合劑の八〇倍液を撒布しませう……

待望の音楽西部劇いよいよ三日まで上映中
進 め 帆 馬 車

厚生會館

は子供の入場を制限するとか、適當な説明付けるとかして童心傷つけない様に御配慮願います。

さる書、地其から、主催者の方で、會の運營について亦御留意下さる様願いす。三、映畫の内容は子向でない場合もありすので、係の意見も参考に入れて充分御討の上、場合によつ

蔓延する！
の豫防が肝心
剤の八〇倍液
せう……
(農務課)

特價販賣
嫁入用
農業用
各種、鹽、桶類
お下命をお待ちして居ります

田北式洋裁専門学校
大分市上野六坊北九郎

モリタ力商店

石罐醬酒
鹹• 詰油類
加• • •
工食砂味
水
產油糖噃